



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA



**PROVA TEÓRICA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS
DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA
VETERINÁRIA DA UFV PARA INGRESSO EM 2021**

CLÍNICA MÉDICA DE CÃES E GATOS

ORIENTAÇÕES GERAIS

1. Esta prova contém 40 questões, cada uma delas valendo 1,25 (um vírgula vinte e cinco) pontos.
2. Use apenas caneta esferográfica contendo tinta azul ou preta para preencher a folha de respostas.
3. A duração da prova será de quatro horas (8 às 12).
4. As respostas das questões de completar deverão se limitar exclusivamente ao espaço fornecido.
5. Não se esqueça de assinar todas as folhas de respostas antes de entregá-la ao fiscal.

26/01/2021
VIÇOSA – MG

QUESTÃO 1.

A _____ é definida como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

A alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna apresentada no texto é:

- A) Vigilância Sanitária
- B) Vigilância Ambiental
- C) Saúde do Trabalhador
- D) Vigilância Epidemiológica

QUESTÃO 2.

As profundas mudanças no perfil epidemiológico das populações, no qual se observa o declínio das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e o crescente aumento das mortes por causas externas e doenças crônicas degenerativas, têm implicado na incorporação de doenças e agravos não transmissíveis ao escopo de atividades da vigilância epidemiológica.

Qual o nome desse processo de mudanças?

- A) Perfil Epidemiológico
- B) Transição Demográfica
- C) Transição Epidemiológica
- D) Transição de Morbidade

QUESTÃO 3.

A operacionalização da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.

Assinale a alternativa que contenha as funções da VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

1. coleta de dados;
2. processamento de dados coletados;
3. análise e interpretação dos dados processados;
4. recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas;
5. promoção das ações de prevenção e controle indicadas;
6. avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;
7. divulgação de informações pertinentes.

- A) Apenas 1, 2, 3 e 7 são funções da Vigilância Epidemiológica
- B) Apenas 1, 2, 6 e 7 são funções da Vigilância Epidemiológica
- C) Apenas 1, 3, 6 e 7 são funções da Vigilância Epidemiológica
- D) Todas são funções da Vigilância Epidemiológica

QUESTÃO 4.

Historicamente, a notificação compulsória tem sido a principal fonte da vigilância epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo informação-decisão-ação. A listagem das doenças de notificação nacional é estabelecida pelo Ministério da Saúde entre as consideradas de maior relevância sanitária para o país. Os parâmetros para inclusão de doenças e agravos na lista de notificação compulsória devem obedecer aos critérios abaixo.

Associe cada critério a sua definição correspondente e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (1) Magnitude**
- (2) Potencial de disseminação**
- (3) Transcendência**
- (4) Vulnerabilidade**
- (5) Compromissos internacionais**

() representado pelo elevado poder de transmissão da doença, através de vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob risco a saúde coletiva.

() expressa-se por características subsidiárias que conferem relevância especial à doença ou agravo, destacando-se: severidade, relevância social, e relevância econômica.

() medida pela disponibilidade concreta de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre indivíduos e coletividades

() aplicável a doenças de elevada frequência, que afetam grandes contingentes populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos.

() relativos ao cumprimento de metas continentais ou mundiais de controle, de eliminação ou de erradicação de doenças, previstas em acordos firmados pelo governo brasileiro com organismos internacionais.

- A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- B) 2 – 3 – 4 – 1 – 5
- C) 2 – 4 – 3 – 1 – 5
- D) 1 – 2 – 4 – 3 – 5

QUESTÃO 5.

Ao considerar diferentes zoonoses e/ou seu “sentido da transmissão”, identifique como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F) as seguintes afirmativas:

- () A raiva é uma zoonose
- () A leptospirose é uma zoonose
- () A febre maculosa é uma zoonose

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) V – V – F
- B) F – V – F
- C) V – F – V
- D) F – F – V

QUESTÃO 6.

O cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de dados que sirvam para subsidiar o processo de produção de informação para ação. A qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados e construção de indicadores.

Assinale a resposta INCORRETA acerca dos indicadores epidemiológicos:

- A) Os coeficientes de morbidade expressam a frequência de uma doença em uma população de uma região, em determinado período de tempo.
- B) A incidência é o número de casos novos de uma doença, ocorridos em uma população particular, durante um período específico de tempo.
- C) A taxa de letalidade indica a probabilidade de morte de um indivíduo de uma dada população, em uma região definida, durante determinado período de tempo.
- D) O coeficiente de mortalidade revela o risco de morte de um indivíduo de uma dada população, em uma região definida, durante determinado período de tempo.

QUESTÃO 7.

Na Saúde Pública, uma das atividades dos médicos-veterinários diz respeito aos acidentes com animais peçonhentos, que ocorrem tanto em áreas urbanas como nas rurais e silvestres. No que diz respeito aos animais peçonhentos, considere as opções abaixo e assinale a que está CORRETA:

- A) É importante eliminar os animais peçonhentos das regiões onde ocorrem os acidentes, utilizando-se de defensivos químicos apropriados, de modo a prevenir novos acidentes.
- B) A principal medida a ser tomada com o indivíduo acidentado é fazer garrote ou torniquete imediatamente e, em seguida, procurar atendimento médico.
- C) A época de “frio e seca” é a mais favorável para a ocorrência dos acidentes, correspondendo na Região Sudeste, aos meses de maio a setembro, pois é quando os animais peçonhentos estão em maior atividade.
- D) A forma mais eficiente de tratamento para acidentados por serpente, escorpião e lagartas (*gênero Lonomia*) é a soroterapia.

QUESTÃO 8.

As medidas de prevenção e controle de roedores devem ser definidas com base no conhecimento prévio da biologia e do comportamento dos roedores, de acordo com seus habitats em cada área (domiciliar, peridomiciliar ou silvestre). Identifique com (A) as medidas de ANTIRRATIZAÇÃO ou (D) as medidas de DESRATIZAÇÃO nas seguintes afirmativas:

- () Eliminar os resíduos, entulhos e objetos inúteis que possam servir de abrigos de roedores
- () Eliminar os roedores através de métodos mecânicos (ratoeiras)
- () Reduzir fontes de água e alimento que possam ser utilizadas pelos roedores
- () Remover diariamente, no período noturno, as sobras dos alimentos de animais domésticos
- () Eliminar os roedores através de métodos químicos (raticidas)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) D – A – D – D – A
- B) D – D – A – A – D
- C) A – D – A – D – A
- D) A – D – A – A – D

QUESTÃO 9.

A leptospirose é causada por uma bactéria do gênero *Leptospira*. É uma doença febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar desde um (1) processo inaparente até formas graves. Trata-se de uma zoonose de grande importância social e econômica, (2) por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, (3) como também por sua letalidade, que pode chegar a 40%, nos casos mais graves. Uma ampla variedade de animais domésticos (cães, bovinos, suínos), sinantrópicos e silvestres estão envolvidos na transmissão da leptospira. Após o contato com a leptospira, os (4) sintomas iniciam-se de 1 a 30 dias, em humanos. (5) Os animais infectados podem eliminar a leptospira através da urina durante meses, anos ou por toda a vida.

Relacione os conteúdos destacados nos trechos sublinhados, no texto anterior, aos conceitos abaixo sobre o aspecto epidemiológico das doenças transmissíveis:

- () Infectividade
- () Patogenicidade
- () Período de incubação
- () Período de transmissibilidade
- () Virulência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) 1 – 2 – 4 – 5 – 3
- B) 2 – 1 – 4 – 5 – 3
- C) 1 – 3 – 4 – 5 – 2
- D) 3 – 1 – 5 – 4 – 2

QUESTÃO 10.

Analise a relação entre as seguintes afirmativas:

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica (Brasil, 2009), o tratamento de animais positivos não é uma medida aceita para o controle da Leishmaniose Tegumentar Americana.

PORQUE

O tratamento de animais com da Leishmaniose Tegumentar Americana poderá conduzir ao risco de selecionar parasitos resistentes às drogas utilizadas para o tratamento de casos humanos.

Marque a alternativa CORRETA:

- A) As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- B) As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- C) A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.

QUESTÃO 11.

Em relação ao ofidismo, assinale a alternativa CORRETA. São considerados venenos com ação proteolítica, neurotóxica e miotóxica, respectivamente:

- A Botrópico, crotálico e crotálico.
- B Crotálico, elapídico, botrópico.
- C Laquético, botrópico e elapídico.
- D Elapídico, laquético e botrópico.

QUESTÃO 12.

Em relação a fluidoterapia:

I-O Ringer com lactato é um fluido cristalóide isotônico, não balanceado indicado como primeira escolha em pacientes desidratados ou hipovolêmicos.

II- A solução hipertônica deve ser evitada em pacientes desidratados.

III- As soluções coloidais estão indicadas em pacientes hipovolêmicos e/ou com hipoalbuminemia.

Com relação as afirmações, é correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II estão corretas
- (B) I e III estão corretas.
- (C) II e III estão corretas.
- (D) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 13.

O atendimento de um paciente politraumatizado é comum na clínica de cães e gatos e representa uma condição de emergência veterinária. Em relação às condutas emergenciais que devem ser adotadas no atendimento de um paciente canino ou felino politraumatizado, analise as afirmações a seguir.

I. A utilização dos fármacos glicocorticoides como terapia anti-inflamatória controlam lesões em sistema nervoso central e deve ser indicada em todos os pacientes após trauma cranioencefálico.

II. Dentre as principais alterações torácicas de um paciente politraumatizado destacam-se o pneumotórax, o hemotórax, as contusões e as hemorragias pulmonares. A hipoxemia em consequência à essas alterações, é definida como PaO₂ (pressão parcial de oxigênio) menor que 90 mmHg no sangue arterial.

III. No atendimento inicial de um paciente com trauma abdominal contuso, com pressão arterial sistólica de 90 mmHg e suspeita de choque hipovolêmico, recomenda-se a realização de exame ultrassonográfico denominado FAST (*Focused Assesment with Sonography for Trauma*) de abdômen.

IV. O sistema ABCDE é uma forma específica de abordagem ao paciente de urgência, realizado nos primeiros cinco minutos de atendimento, dividida em etapas que apenas serão ultrapassadas quando a etapa prévia foi completa, corrigindo as alterações que são identificadas imediatamente.

V. A interpretação do sistema ABCDE corresponde à: A: Abertura – exposição de vísceras ou ossos. B: Eficácia da ventilação/respiração. C: Coração – frequência cardíaca dentro dos parâmetros da normalidade. D – Déficit neurológicos. E – Exames laboratoriais.

Com relação as afirmações, é correto apenas o que se afirma em:

- (A) I, III e IV estão corretas.
- (B) II, III e IV estão corretas.
- (C) I, II, III e IV estão corretas.
- (D) I, II, III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 14.

Sobre a Síndrome do Cão Braquicefálico, analise as afirmações a seguir.

I. Se caracteriza por duas anormalidades anatômicas: estenose de narinas e palato mole alongado, que resultam em sinais clínicos como dispneia, respiração ruidosa e ptialismo.

II. Quando o problema é diagnosticado precocemente, o tratamento medicamentoso com corticoide é eficaz na resolução do problema.

III. A correção cirúrgica precoce das anormalidades diminui a pressão negativa sobre a faringe e laringe, retardando assim a progressão da doença.

IV. Eversão de sacos laríngeos, colapso de laringe e hipoplasia de traqueia são complicações comuns quando se remove excesso de palato mole durante procedimento de estafilectomia em braquicefálicos e, podem ser evitados por meio de realização de tomografia computadorizada no pré-operatório.

V. Na síndrome braquicefálica, deve-se utilizar medicação pré-anestésica para reduzir o estresse e a ansiedade, pré-oxigenar o paciente antes da indução anestésica e retirar o tubo orotraqueal tão logo retorne o reflexo laringotraqueal.

Com relação as afirmações, é correto apenas o que se afirma em:

- (A) III está correta.
- (B) I, III e IV estão corretas.
- (C) I, III e V estão corretas.
- (D) I, II, III e V estão corretas.

QUESTÃO 15.

Relacione os fármacos da primeira coluna com suas respectivas classes na segunda coluna:

1	Acepromazina	()	Opioide
2	Dexmedetomidina	()	Benzodiazepínico
3	Sevoflurano	()	Barbitúrico
4	Flumazenil	()	Anestésico local
5	Cetamina	()	Agonista α -2
6	Glicopirrolato	()	Dissociativo
7	Tiopental	()	Halogenado
8	Ropivacaína	()	Fenotiazínico
9	Naloxona	()	Anticolinesterásico
10	Neostigmina	()	Anticolinérgico

QUESTÃO 16.

Assinale a alternativa que representa efeitos da acepromazina em cães:

- A Analgesia, hipoglicemia e redução da pressão arterial.
- B Êmese, ação anti-histamínica e redução da temperatura corporal.
- C Ação anti-arritmogênica, tranquilização, redução da pressão arterial.
- D Tranquilização, aumento da temperatura corporal e hiperglicemia.

QUESTÃO 17.

Um cão macho de 5 anos é apresentado ao médico veterinário com hematúria. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à relação entre suspeita e exame a ser requisitado:

- A Radiografia simples para avaliação de cálculo vesical.
- B Radiografia simples para diagnóstico de ruptura de bexiga.
- C Ultrassonografia para diagnóstico de cálculo renal.
- D Ultrassonografia para avaliação de neoplasias na bexiga.

QUESTÃO 18.

A ultrassonografia permite a avaliação da hepatomegalia. Assinale a afecção que NÃO está associada à hepatomegalia:

- A Insuficiência cardíaca congestiva
- B Lipidose
- C Hiperadrenocorticismo
- D Desvio portossistêmico

QUESTÃO 19.

Líquidos cavitários, classificação das efusões: com relação as características dos transudatos assinale a alternativa INCORRETA.

- A Baixa contagem de células nucleadas com predomínio de mononucleares na contagem diferencial
- B Alta contagem de eritrócitos
- C Fluidos transparentes
- D Baixa concentração de proteínas (<2,5 g/dL)

QUESTÃO 20.

Hematologia: na interpretação do hemograma de cães são características indicativas de anemia regenerativa, EXCETO.

- A Policromatofilia intensa
- B Presença de metarrubricitos
- C Hipocromia
- D Contagem alta de reticulócitos

QUESTÃO 21.

Assinale a alternativa CORRETA. É considerado quadro clínico mimético ao da dermatite úmida aguda canina:

- A Foliculite e furunculose piotraumática.
- B Dermatite pustulosa superficial.
- C Foliculite e furunculose mentoniana.
- D Pênfigo eritematoso.

QUESTÃO 22.

Assinale a alternativa INCORRETA.

- A Malasseziose é um complicador da dermatite atópica.
- B Predisposição genética provavelmente esta envolvida na patogênese da malasseziose, pois algumas raças possuem risco aumentado para a infecção.
- C Em felinos, a malasseziose pode estar associada a enfermidades de pior prognóstico, como a alopecia paraneoplásica.
- D Áreas não frequentemente acometidas na malasseziose canina incluem lábio, axila, região inguinal e cervical ventral.

QUESTÃO 23.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A Os dermatófitos que mais frequentemente acometem cães e gatos são o *Microsporum e Trichosporon*.
- B Nistatina, cetoconazol e griseofulvina são antifúngicos indicados para o tratamento da dermatofitose canina e felina.
- C Quérion é uma furunculose nodular dermatofítica.
- D Em cães, se uma lesão de pele parece dermatofitose, provavelmente trata-se mesmo de dermatofitose.

QUESTÃO 24.

Em relação à demodicose, assinale a alternativa CORRETA.

- A Estudos revelam que cães com demodicose generalizada exibem imussupressão humoral.
- B Hipofunção da imunidade celular, mediada por células T, não ocorre na demodicose generalizada.
- C *Demodex gatoi* pode levar à dermatose alopecica e pruriginosa em felinos, sendo também enfermidade contagiosa.
- D Há evidências sólidas de que o tratamento tópico da demodicose canina localizada previne a generalização.

QUESTÃO 25.

Em relação às endocrinopatias. Assinale a alternativa CORRETA.

- A *Calcinose cutis* e mucinose dérmica são achados patológicos fortemente sugestivos de hiperadrenocorticismismo e hipotireoidismo, respectivamente.
- B Insulina NPH está indicada para o tratamento emergencial da cetoacidose diabética.
- C O teste de estimulação com ACTH é fundamental para diferenciar hiperadrenocorticismismo hipófise dependente do adrenal dependente.
- D O trilostano induz a uma necrose seletiva do córtex adrenal, sendo o fármaco de escolha para tratar o hiperadrenocorticismismo espontâneo canino.

QUESTÃO 26.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A Carcinoma inflamatório de mama é de fato uma doença pseudoneoplásica, onde a intensa reação celulítica supurativa é a alteração patológica principal.
- B A hipercalcemia é uma alteração paraneoplásica que pode ocorrer nos linfomas caninos.
- C Vimbastima, a despeito dos anos, é ainda o quimioterápico de primeira escolha para os casos de TVT.
- D Micose fungóide é uma terminologia tradicional usada para descrever os casos de histiocitose canina e felina.

QUESTÃO 27.

Assinale a alternativa que **NÃO REPRESENTA** um distúrbio da micção que ocorre com a distensão de bexiga.

A	Trauma medular nos segmentos sacrais
B	Hiperreflexia do detrusor
C	Trauma medular no segmento T13-L1
D	Dissenergia reflexa

QUESTÃO 28.

Assinale a alternativa que **NÃO REPRESENTA** uma opção de primeira escolha para o tratamento de infecção urinária.

A	Sulfametoxazol com trimetoprim
B	Amoxicilina
C	Meropenen
D	Enrofloxacina

QUESTÃO 29.

Um cão, raça Labrador, de nove anos, foi encaminhado aos seus cuidados com histórico de estridor e angústia respiratória aguda. O tutor relatou que o animal apresentou alteração do latido e engasgo ao se alimentar algumas semanas antes da piora clínica. Baseado nas informações acima, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

A	Edema pulmonar
B	Cardiomiopatia dilatada
C	Paralisia laríngea
D	Pólipo nasofaríngeo

QUESTÃO 30.

Um gato, SRD, de dois anos, foi encaminhado aos seus cuidados com histórico de taquipneia. O exame radiográfico revelou aumento da silhueta cardíaca e a presença de estruturas tubulares preenchidas por gás no pericárdio, além de perda da definição diafragmática.

Baseado nas informações acima, escreva abaixo o nome da provável anormalidade congênita.

Resposta:

QUESTÃO 31.

Assinale a alternativa que representa um diurético de alça utilizado em cães que se tornam refratários a altas doses de furosemida no tratamento crônico da insuficiência cardíaca.

A	Espironolactona
B	Clorotiazida
C	Hidroclorotiazida
D	Torsemida

QUESTÃO 32.


A ilustração abaixo apresenta os sons cardíacos associado a um ciclo do ECG. Identifique os sons cardíacos (bulhas) que estão representados pelas letras i, ii, iii e iv. Utilize na sua resposta a seguinte simbologia:

Primeira bulha: S1.

Segunda bulha: S2.

Terceira bulha: S3.

Quarta bulha: S4



Resposta:

i	ii	iii	iv


QUESTÃO 33.

Com relação à fração de excreção de sódio urinário ($FE Na_{urina}$), qual alternativa abaixo é mais condizente com a interpretação de azotemia pré-renal.

A	$FE Na_{urina} < 1\%$
B	$FE Na_{urina}$ entre 1-5%
C	$FE Na_{urina}$ entre 5-8%
D	$FE Na_{urina} > 8\%$

QUESTÃO 34.

Assinale a sentença que indica o distúrbio de ritmo representado pelo traçado eletrocardiográfico abaixo (D2, 25mm/s, 1cm=1mV).



A	Flutter atrial
B	Contração atrial prematura
C	Taquicardia ventricular
D	Flutter ventricular

QUESTÃO 35.

Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação aos procinéticos gastrointestinais

A	Estão indicados no megacolon
B	Estão indicados no tratamento do íleo adinâmico
C	Estão indicados nas esofagites de refluxo
D	Estão indicados em todos os casos de esvaziamento gástrico tardio

QUESTÃO 36.

Assinale a alternativa **CORRETA**. Em qual enfermidade gastrointestinal o uso de antibióticos é fundamental.

A	Gastroenterites virais
B	Enterite linfoplasmocitária
C	Colite granulomatosa dos braquicefálicos
D	Enteropatias perdedoras de proteínas no Yorkshire

QUESTÃO 37.

Assinale a alternativa **INCORRETA**. A etiopatogenia das colangites em gatos pode estar associada a:

A	Bactérias de origem intestinal
B	Parasitas trematódeos
C	Mecanismos imunomediados
D	Parasitas protozoários

QUESTÃO 38.

Assinale a alternativa **CORRETA** em relação aos Hepatoprotetores

A	SAMe não é indicado em felinos
B	Acetilcisteína endovenosa é uma opção de hepatoproteção no paciente crítico
C	A Silimarina não deve ser empregada nos pacientes com colestase intra-hepática
D	O ácido ursodesoxicólico (Ursacol) está indicado no paciente com colestase extra-hepática de causa obstrutiva

QUESTÃO 39.

Assinale a alternativa **CORRETA**. Os glicocorticoides são contraindicados na:

A	Discoespondilite
B	Neoplasia cerebral
C	Menigoencefalite granulomatosa
D	Menigoencefalite responsiva a esteróides

QUESTÃO 40.

Cão SRD, macho, 5 anos apresentado para consulta com tetraplegia, hiporreflexia nos 4 membros, nocicepção presente e consciência preservada. Entre os diagnósticos diferenciais qual seria o mais provável:

A	Hérnia de disco cervical
B	Hérnia de disco cervicotorácica
C	Hérnia de disco toracolombar
D	Polineuropatia periférica



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA
VETERINÁRIA**



**PROVA TEÓRICA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS
OFERECIDAS
PARA INGRESSO EM 2021**

CLÍNICA MÉDICA DE CÃES E GATOS

Nome: _____

26/01/2021

(Assine também as demais folhas)

FOLHAS DE RESPOSTAS

Assinale a alternativa escolhida nas questões objetivas ou complete conforme perguntado na questão específica.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

13				
14				
15	()			
	()			
	()			
	()			
	()			
	()			
	()			
	()			
	()			
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Nome: _____

26/01/2021

	A	B	C	D
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Nome: _____

26/01/2021



PROVA TEÓRICA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS OFERECIDAS PARA INGRESSO EM 2021

GABARITO DEFINITIVO – CLÍNICA MÉDICA DE CÃES E GATOS

Questões 1 a 40.

	A	B	C	D
1				X
2			X	
3				X
4		X		
5		X		
6			X	
7				X
8				X
9		X		
10	X			
11	X			
12			X	
13		X		
14	X			
15	9 4 7 8 2 5 3 1 10 6			
16			X	
17		X		
18				X
19		X		
20			X	
21	X			
22				X
23			X	
24			X	
25	X			
26		X		

27		X		
28			X	
29			X	
30	Hérnia diafragmática peritoneopericárdica			
31				X
32	S4, S1, S2, S3			
33	X			
34		X		
35				X
36			X	
37				X
38		X		
39	X			
40				X