



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA**  
**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA**



**PROVA TEÓRICA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS  
DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA  
VETERINÁRIA DA UFV PARA INGRESSO EM 2020**

**CLÍNICA MÉDICA DE CÃES E GATOS**

**ORIENTAÇÕES GERAIS**

1. Esta prova contém 40 questões, cada uma delas valendo 1,25 (um vírgula vinte e cinco) pontos.
2. Use apenas caneta esferográfica contendo tinta azul ou preta para preencher a folha de respostas.
3. A duração da prova será de quatro horas (8 às 12).
4. As respostas das questões de completar deverão se limitar exclusivamente ao espaço fornecido.
5. Não se esqueça de assinar todas as folhas de respostas antes de entregá-la ao fiscal.

**19/11/2019**  
**VIÇOSA – MG**

### **QUESTÃO 01.**

A \_\_\_\_\_ é definida como um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

A alternativa que preenche **CORRETAMENTE** a lacuna apresentada no texto é:

- A. Vigilância Sanitária
- B. Vigilância Ambiental
- C. Saúde do Trabalhador
- D. Vigilância Epidemiológica

### **QUESTÃO 02.**

O sistema de Informação que tem por objetivo o registro e o processamento dos dados sobre agravos de notificação compulsória em todo território nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal é:

- A. SINS – Sistema de Informações Notificáveis de Saúde
- B. SIM – Sistema de Informações de Morbimortalidade
- C. SIAS – Sistema de Internação de Agravos de Saúde
- D. SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

### **QUESTÃO 03.**

Ao considerar diferentes zoonoses e/ou seu “sentido da transmissão”, identifique como **VERDADEIRAS (V)** ou **FALSAS (F)** as seguintes afirmativas:

- ( ) A raiva é uma zoonose
- ( ) A leptospirose é uma antropozoonose
- ( ) A febre maculosa é uma zoonose

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:**

- A. V – V – F
- B. F – V – F
- C. V – F – V
- D. F – F – V

**QUESTÃO 04.**

**O cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de dados que sirvam para subsidiar o processo de produção de informação para ação. A qualidade da informação depende, sobretudo, da adequada coleta de dados e construção de indicadores.**

**Assinale a resposta INCORRETA acerca dos indicadores epidemiológicos:**

- A. Os coeficientes de morbidade expressam a frequência de uma doença em uma população de uma região, em determinado período de tempo.
- B. A incidência é o número de casos novos de uma doença, ocorridos em uma população particular, durante um período específico de tempo.
- C. A taxa de letalidade indica a probabilidade de morte de um indivíduo de uma dada população, em uma região definida, durante determinado período de tempo.
- D. O coeficiente de mortalidade revela o risco de morte de um indivíduo de uma dada população, em uma região definida, durante determinado período de tempo.

**QUESTÃO 05.**

**Na Saúde Pública, uma das atividades dos médicos-veterinários diz respeito aos acidentes com animais peçonhentos, que ocorrem tanto em áreas urbanas como nas rurais e silvestres. No que diz respeito aos animais peçonhentos, considere as opções abaixo e assinale a que está CORRETA:**

- A. É importante eliminar os animais peçonhentos das regiões onde ocorrem os acidentes, utilizando-se de defensivos químicos apropriados, de modo a prevenir novos acidentes.
- B. A principal medida a ser tomada com o indivíduo acidentado é fazer garrote ou torniquete imediatamente e, em seguida, procurar atendimento médico.

C. A época de “frio e seca” é a mais favorável para a ocorrência dos acidentes, correspondendo na Região Sudeste, aos meses de maio a setembro, pois é quando os animais peçonhentos estão em maior atividade.

D. A forma mais eficiente de tratamento para acidentados por serpente, escorpião e lagartas (gênero *Lonomia*) é a soroterapia.

#### **QUESTÃO 06.**

**As medidas de prevenção e controle de roedores devem ser definidas com base no conhecimento prévio da biologia e do comportamento dos roedores, de acordo com seus habitats em cada área (domiciliar, peridomiciliar ou silvestre). Identifique com (A) as medidas de ANTIRRATIZAÇÃO ou (D) as medidas de DESRATIZAÇÃO nas seguintes afirmativas:**

- Eliminar os resíduos, entulhos e objetos inúteis que possam servir de abrigos de roedores**
- Eliminar os roedores por meio de métodos mecânicos (ratoeiras)**
- Reduzir fontes de água e alimento que possam ser utilizadas pelos roedores**
- Remover diariamente, no período noturno, as sobras dos alimentos de animais domésticos**
- Eliminar os roedores por meio de métodos químicos (raticidas)**

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:**

- A. D – A – D – D – A**
- B. D – D – A – A – D**
- C. A – D – A – D – A**
- D. A – D – A – A – D**


### QUESTÃO 07.

A Agente de Combate às endemias (ACE), em visita domiciliar em sua microárea fora informada pelo morador que o seu cão de estimação, há cinco dias, começou a apresentar comportamento estranho, com excitação e agressividade, alterações do latido e não reconhece o próprio dono. A ACE suspeitou de caso de Raiva. Marque a alternativa que constitui intervenção CORRETA em casos de raiva em caninos e/ou felinos:

- A. O animal com suspeita de raiva deve ser vacinado com a aplicação de 2 doses de vacina antirrábica canina, nos dias 0 e 7 e ser submetido ao isolamento por 120 dias.
- B. Os cães e gatos que tenham sido mordidos por animais raivosos devem ser submetidos à eutanásia.
- C. O animal que foi agredido por animal raivoso, independentemente do histórico de vacinação antirrábica, deve ser mantido em quarentena.
- D. O animal suspeito de raiva deve ser eutanasiado para confirmação do diagnóstico por meio de exame laboratorial do tecido do sistema nervoso central.

### QUESTÃO 08.

A figura abaixo representa a análise gráfica da dispersão de uma doença transmitida a um grupo de pessoas que compartilhou o mesmo ambiente de trabalho. Não era esperado nenhum caso dessa doença para essa população, nessa região e período de tempo.



De acordo com as informações anteriores e o padrão apresentado no gráfico, o perfil de transmissão da doença pode ser classificado como:

- A. Surto epidêmico
- B. Surto endêmico
- C. Epidemia maciça
- D. Epidemia por fonte comum

**QUESTÃO 09.**

A leptospirose é causada por uma bactéria do gênero *Leptospira*. É uma doença febril de início abrupto, cujo espectro clínico pode variar desde um (1) processo inaparente até formas graves. Trata-se de uma zoonose de grande importância social e econômica, (2) por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, (3) como também por sua letalidade, que pode chegar a 40%, nos casos mais graves. Uma ampla variedade de animais domésticos (cães, bovinos, suínos), sinantrópicos e silvestres estão envolvidos na transmissão da *leptospira*. Após o contato com a *leptospira*, os (4) sintomas iniciam-se de 1 a 30 dias, em humanos. (5) Os animais infectados podem eliminar a *leptospira* através da urina durante meses, anos ou por toda a vida.

Relacione os conteúdos destacados nos trechos sublinhados, no texto anterior, com os conceitos abaixo sobre o aspecto epidemiológico das doenças transmissíveis:

- ( ) Infectividade
- ( ) Patogenicidade
- ( ) Período de incubação
- ( ) Período de transmissibilidade
- ( ) Virulência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A. 1 – 2 – 4 – 5 – 3
- B. 2 – 1 – 4 – 5 – 3
- C. 1 – 3 – 4 – 5 – 2
- D. 3 – 1 – 5 – 4 – 2

### QUESTÃO 10.

Analise a relação entre as seguintes afirmativas:

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica (Brasil, 2009), o tratamento de animais positivos não é uma medida aceita para o controle da Leishmaniose Tegumentar Americana.

### PORQUE

O tratamento de animais com da Leishmaniose Tegumentar Americana poderá conduzir ao risco de selecionar parasitos resistentes às drogas utilizadas para o tratamento de casos humanos.

Marque a alternativa CORRETA:

- A. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- B. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- C. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
- D. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.

### QUESTÃO 11.

Necessito preparar uma solução de lidocaína em NaCl 0,9%. A dose de infusão da lidocaína é 50 microgramas/kg/minuto e a velocidade de infusão da solução preparada é de 1ml/kg/hora. O volume final da solução é de 500mL. Qual o volume, em mL, de lidocaína a 2% necessário para o preparo da solução?

<b>A</b>	25 mL
<b>B</b>	50 mL
<b>C</b>	75 mL
<b>D</b>	100 mL

## QUESTÃO 12.

**Qual fármaco abaixo NÃO deve ser utilizado no protocolo anestésico de um cão com suspeita de anafilaxia:**

- A Butorfanol.
- B Cetamina.
- C Meperidina.
- D Midazolam.

## QUESTÃO 13

**Piometra é uma anormalidade uterina que se desenvolve durante o diestro onde há uma produção excessiva e prolongada de progesterona. Os animais com esta complicação podem se apresentar com anorexia, prostração, perda de peso, leucocitose e presença de secreção vaginal ou não. Com relação ao tema, analise as afirmações a seguir:**

**I.** Uma associação entre piometra e a afecção uterina mais comum em fêmeas caninas, a hiperplasia endometrial cística, foi estabelecida. O processo degenerativo progressivo desenvolvido pela hiperplasia endometrial cística, decorrente de distensão glandular e fibrose, é proposto como lesão inicial da piometra em fêmeas caninas, mediada por progesterona e gravada por estrógenos.

**II.** A sequência determinada por progesterona resultando em hiperplasia endometrial cística, e hiperplasia endometrial cística resultando em piometra, pode não estar correta, e bactérias podem ser o agente causador inicial. A infecção subclínica do útero ou do endométrio causada por corpos estranhos no final do estro ou durante primeira metade do diestro proporciona estímulo para hipertrofia e hiperplasia excessiva do endométrio, como observado no momento da implantação do embrião. Tal manifestação é conhecida como Hiperplasia Endometrial Pseudoplacentacional.

**III.** A progesterona é responsável pelo aumento da taxa de migração de neutrófilos para o lúmen uterino promovendo efeito bactericida, relaxamento e dilatação da cérvix, aumento da intensidade de contração do miométrio promovendo drenagem do conteúdo uterino.

**IV.** A progesterona estimula a proliferação glandular, aumenta atividade secretória das glândulas endometriais, promove fechamento da cérvix, redução da atividade leucocitária, inibição da atividade contrátil do miométrio impedindo a drenagem de fluido intra-uterino.

**V.** Até a presente data, a intervenção cirúrgica por meio de ovariohisterectomia é recomendada para pacientes em críticas condições clínicas, entretanto, pacientes em condições clínicas não muito graves, com alto valor zootécnico, podem ser submetidos a tratamento clínico com GLUCONATO de Cálcio e Cipionato de Estradiol, e monitoração intensiva, para assegurar cura completa e evitar recidivas.

**Com relação às afirmações, é correto o que se afirma em:**

- (A) I, II e III.
- (B) I, II e IV.
- (C) I, II, III e V.
- (D) I, II, IV e V.

#### **QUESTÃO 14**

**Um cão da raça Boxer, com 30 kg e 3 anos foi atendido por um médico veterinário uma hora após ter sido atropelado por um carro. Uma lesão grave no membro torácico resultou em ruptura da veia cefálica e perda de grande quantidade de sangue. O animal apresentava-se prostrado, com pulso fraco, TPC = 3'', taquicardia, extremidades frias, temperatura 37°C e hidratação normal. Um exame laboratorial revelou hematócrito = 30% (37 – 54%) e PPT=5,5 g/dl (6,0-7,5 mg/dl). Sobre o caso proposto, assinale a alternativa correta.**

- (A) O animal encontra-se em choque distributivo, fase descompensatória inicial e o tratamento emergencial para esse paciente deve ser a administração de infusão rápida de 270 ml de solução de ringer c/ lactato.
- (B) O animal encontra-se em choque hipovolêmico, fase terminal e o tratamento emergencial para esse paciente deve ser a administração de 600 ml de sangue total.
- (C) O animal encontra-se em choque hipovolêmico, fase descompensatória inicial e o tratamento emergencial para esse paciente deve ser a administração de infusão rápida de 3 litros de solução de ringer lactato.
- (D) O animal encontra-se em choque distributivo, fase terminal e o tratamento emergencial para esse paciente deve ser a administração de 600 ml de sangue total.

#### **QUESTÃO 15.**

**Sobre a análise do hemograma nas anemias é INCORRETO afirmar que:**

- A A presença de hemácias nucleadas, policromatofilia e contagem alta de reticulócitos são indicativos de anemia regenerativa
- B O VCM de 49 fL em cão anêmico confere com anemia microcítica
- C A observação de corpúsculo de Döhle em muitas hemácias está relacionada a anemia regenerativa
- D A baixa nos índices hematológicos (hemácias, hemoglobina e hematócrito) sem alterações no RDW, VCM e CHCM é compatível com anemia por deficiência de eritropoietina.

### QUESTÃO 16.

**Interpretação do leucograma: coloque V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas.**

- ( ) A presença de metamielócitos na contagem diferencial de leucócitos está sempre relacionada ao desvio de neutrófilos a esquerda degenerativo
- ( ) A ocorrência de neutrófilos hipersegmentados na contagem diferencial de leucócitos tem como uma das principais causas o aumento de corticoides na circulação
- ( ) A observação de blastos na análise do esfregaço sanguíneo sugere possível quadro de septicemia
- ( ) Hemograma com leucopenia em animais jovens com quadro de diarreia está frequentemente associado ao diagnóstico de parvovirose.

### QUESTÃO 17.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

Cão jovem com gastroenterite, 5 kg de peso e desidratação de 8% deverá receber na fluidoterapia de reposição do déficit:

- A 400 ml endovenoso de solução glicosada 5%
- B 800 ml endovenoso de solução coloidal
- C 400 ml endovenoso de solução cristalóide ringer lactato
- D 800 ml endovenoso de solução hipertônica NaCl 7,5%

### QUESTÃO 18.

**Assinale a alternativa CORRETA.**

Paciente felino, com icterícia, anemia regenerativa e reticulocitose provavelmente apresenta:

- A Lipidose hepática primária
- B Pancreatite com obstrução biliar extra-hepática
- C Platinossomose
- D Anemia hemolítica autoimune

### **QUESTÃO 19.**

**Quanto às indicações de realização de exame ultrassonográfico, assinale a alternativa INCORRETA:**

- A** - Um gato resgatado da rua com dispneia com exame ultrassonográfico para avaliação de hérnia diafragmática.
- B** - Uma queda do segundo andar de um gato com fratura de costela utilizando o exame ultrassonográfico para detectar efusão pleural.
- C** - Histórico de incontinência urinária utilizando o exame ultrassonográfico para diagnóstico de ureter ectópico.
- D** - Histórico de anorexia e dor abdominal utilizando o exame ultrassonográfico para diagnóstico de intussuscepção.

### **QUESTÃO 20.**

**Na avaliação dos exames radiográficos do tórax e do abdômen de um cão de 13 anos com endocardiose bilateral de valvas tricúspide e mitral e consequente insuficiência cardíaca, são todos sinais possíveis de serem visibilizados, EXCETO:**

- A** - Deslocamento ventral do coração
- B** - Deslocamento dorsal da traquéia
- C** - Padrão alveolar perihilar bilateral
- D** - Hepatomegalia

**QUESTÃO 21.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

A exodontia radical está indicada no tratamento de qual das enfermidades abaixo:

- A Doença periodontal.
- B Gengivite-estomatite linfoplasmocitária felina.
- C Estomatite ulcerativa necrosante.
- D Mucocele salivar.

**QUESTÃO 22.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

A estenose esofágica em cães pode ter como principal causa:

- A Cirurgias esofágicas prévias.
- B Corpos estranhos.
- C Tratamento com glicocorticóides.
- D Esofagite por refluxo gastroesofágico.

**QUESTÃO 23.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

Vômitos tardios em relação a alimentação e com alimento não digerido sugere:

- A Hipomotilidade gástrica.
- B Megaesôfago.
- C Esofagite.
- D Hérnia de hiato.

**QUESTÃO 24.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

Ação antiemética, antiácida e pró-cinética, respectivamente é esperada com:

- A Ondansetrona, ranitidina, famotidina
- B Metoclopramida, omeprazol, simeticona
- C Citrato de maropitant, pantoprazol, domperidona
- D Acepromazina, bromoprida, sucralfato.

**QUESTÃO 25.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

Budesonida pode ser indicada no tratamento de:

- A Gastrite crônica
- B Doença intestinal inflamatória
- C Linfoma intestinal
- D Giardiose

**QUESTÃO 26.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

Andar contínuo e pressionar cabeça contra obstáculos indica lesão neurológica:

- A Cerebelar
- B Vestibular
- C Cerebral
- D Tronco encefálico

**QUESTÃO 27.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

Tetraparesia flácida com diminuição dos reflexos segmentares nos quatro membros é compatível com:

- A Traumatismo da medula cervical
- B Hérnia de disco cervicotorácica tipo II
- C Síndrome de Woobler
- D Poliradiculoneurite.

**QUESTÃO 28**

Qual dos fármacos quimioterápicos abaixo tem importante efeito cardiotoxíco e deve ser evitado em cães cardiopatas?

A	Vincristina
B	Doxorrubicina
C	Ciclofosfamida
D	Lomustina

**QUESTÃO 29**

Dentre os fármacos abaixo, assinale aquele utilizado na insuficiência cardíaca pelo seu efeito antagonista da aldosterona.

A	Furosemida
B	Pimobendam
C	Benazepril
D	Espironolactona

**QUESTÃO 30**

Assinale a alternativa que representa o traçado eletrocardiográfico abaixo:



DII, 25 mm/s, 1 cm/mV

A	Bloqueio sinoatrial
B	Arritmia sinusal e marcapasso migratório
C	Bloqueio atrioventricular de primeiro grau
D	Bloqueio atrioventricular de segundo grau

### QUESTÃO 31

Sobre a endocardite bacteriana, é correto afirmar, exceto:

A	As lesões vegetativas valvares podem liberar fragmentos na circulação sanguínea.
B	É mais comum em cães que em gatos.
C	A insuficiência valvar não conduz a insuficiência cardíaca congestiva
D	As valvas aórtica e mitral são mais envolvidas em cães e gatos.

### QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que melhor representa os achados radiográficos de um gato com pneumonia causada por *Cryptococcus sp.*

A	Padrão intersticial nodular miliar difuso
B	Padrão bronquial difuso
C	Padrão alveolar e bronquial difusos
D	Padrão vascular difuso

### QUESTÃO 33.

Um gato, de 1 ano, foi encaminhado aos seus cuidados com evolução progressiva de estertor respiratório, corrimento nasal, obstrução de vias aéreas superiores e sinais de otite média. Com base nas informações acima, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

A	Infecção micótica
B	Otite por <i>Otodectes cynotis</i>
C	Paralisia laríngea
D	Pólipo nasofaríngeo

### QUESTÃO 34.

Ascite, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e proteinúria são achados de:

A	Insuficiência pancreática exócrina
B	Insuficiência cardíaca congestiva direita
C	Síndrome nefrótica
D	Cistite idiopática felina

### QUESTÃO 35

Assinale a alternativa **correta**. As bactérias meticilina resistentes tem cada vez mais adquirido importância na patogênese das infecções bacterianas da pele. Atualmente, a espécie mais envolvida nas piодermites caninas é:

A	<i>Staphylococcus pseudintermedius</i> .
B	<i>Staphylococcus epidermidis</i> .
C	<i>Staphylococcus aureus</i> .
D	<i>Streptococcus sp.</i>

### QUESTÃO 36

Assinale a alternativa **correta**. O prurido “feroz ou biopsiante” é um sinal clínico muito frequente na escabiose canina, levando a lesões tegumentares decorrentes de autotrauma. O padrão de distribuição lesional da escabiose canina é tipicamente:

A	Latero-ventral do tronco, membros, segmento cefálico e pavilhão auricular.
B	Tronco dorsal, periocular, pavilhão auricular e patas.
C	Tronco dorso-lateral, junções mucocutâneas e pavilhão auricular.
D	Tronco lateral, ponte e plano nasal e periocular.

### QUESTÃO 37

Assinale a alternativa **correta**. A presença de lesões vesicopustulosas com abundantes neutrófilos íntegros e ceratinócitos acantolíticos é um achado morfológico fortemente sugestivo de:

A	Penfigóide bolhoso.
B	Penfigóide cicatricial.
C	Pênfigo foliáceo e eritematoso.
D	Lupus eritematoso.

### QUESTÃO 38

Assinale a alternativa **correta**. Quais dos seguintes fármacos estão indicados para o tratamento da dermatofitose canina e felina:

A	Nistatina, terbinafina, itraconazole.
B	Flucitosina, griseofulvina, terbinafina.
C	Nistatina, clotrimazole, itraconazole.
D	Itraconazole, terbinafina, griseofulvina.

### QUESTÃO 39

Assinale a alternativa **correta**. Trata-se de um tumor de células redondas, crescimento rápido, acomete predominantemente animais mais jovens, com localização preferencial para cabeça, pavilhões auriculares e membros.

A	Plasmocitoma.
B	Histiocitoma.
C	Tricoblastoma.
D	Papiloma.

### QUESTÃO 40

Assinale a alternativa **correta**. A calcificação distrófica das fibras colágenas é um achado histopatológico, embora não patognomônico, muito sugestivo para um tipo de endocrinopatia. A endocrinopatia em tela e o nome dessa alteração morfológica são respectivamente:

A	Hiperadrenocorticismismo e flebectasias.
B	Hipotireoidismo e calcinose circunscrita.
C	Hiperadrenocorticismismo e calcinose cutis.
D	Hipotireoidismo e mixedema calcificante.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE**  
**DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA**  
**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA**

**PROVA TEÓRICA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS OFERECIDAS PARA INGRESSO EM 2020**  
**CLÍNICA MÉDICA DE CÃES E GATOS**

Nome: GABARITO 19/11/2019  
*(Assine também na lateral das demais folhas)*

**CARTÃO DE RESPOSTAS**

Questões 1 a 40.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	V ( ) ou F ( <input checked="" type="checkbox"/> ) V ( <input checked="" type="checkbox"/> ) ou F ( ) V ( ) ou F ( <input checked="" type="checkbox"/> ) V ( <input checked="" type="checkbox"/> ) ou F ( )			
17				
18				
19	<b>ANULADA</b>			
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

<b>34</b>				
<b>35</b>				
<b>36</b>				
<b>37</b>				
<b>38</b>				
<b>39</b>				
<b>40</b>				